

Is consent during labour acceptable?

Legal Department &
Compliance

Dr. iur. Thomas Gruberski



3. November 2016 (Heilkunde)

SEITE 8

Welsche Frauen gebären deutlich häufiger betäubt

BERN. Gebärende aus der Romandie lassen sich häufiger ein Anästhetikum spritzen als Deutschschweizerinnen. Weshalb?

Frauen aus der Romandie scheinen am schmerzempfindlichsten zu sein. Eine Datenerhebung von 20 Minuten zeigt: Zwischen 62 und 80 Prozent der Gebärenden aus der Westschweiz lassen sich im Spital eine Periduralanästhesie (PDA) spritzen, um die Schmerzen zu lindern.

In der Deutschschweiz tun das nur 25 bis 30 Prozent. Eine Ausnahme bildet das Universitätsspital Basel. Dort wünscht sich rund die Hälfte der Frauen eine PDA, dasselbe gilt für die Spitäler im Tessin. Im Unispital Genf wird bei satten 80 Prozent der Gebärenden eine PDA eingesetzt. Die tiefste Rate hat das Inselspital Bern mit 25 Prozent. Sprecherin Susanne Bandi: «Unsere Ärzte raten nicht davon ab, drängen eine PDA aber auch nicht auf.»

Introduction

Case

A woman is giving birth. The labour pains have already started.

She wishes to get an Epidural. Before, this issue was never an issue.

>> What do you do?

The principle of self-determination...

- ... is a result of patient's autonomy and his right of personal freedom;
- ... is a fundamental patient's right and a central concept of medical ethics;
- ... causes the respect towards the patient's will.

Informed consent – historical dimension

From paternalism....

... to self-determination

Informed consent (IC) – requirements

- The IC is correct, if...
 - ... the ***information*** is correct; and
 - ... the patient is competent to ***judge***

What does «correct» mean?

- *Complete* (esp. in terms of the intervention's scope & effects, risks & burdens, alternatives);
- *Before* the intervention;
- *Adequate time* to consider:
 - 72 hours before difficult / "severe" interventions
 - One night before "light" interventions

IC @ Epidural?

What's your opinion?

Taking into consideration, that...

- ... the patient is regularly in heavy pain («Two sides syndrome»);
- ... is facing a special situation (also) from the psychological point of view;
- ... other factors?

A possible solution

- >> IC: no, but...
- >> Hypothetical / presumed consent
- >> Based on the question: «How would a normal and rationally thinking patient decide?»

Thank you for your attention.