

Urgenza dell'intervento, definizione ed esempi (Var. 20202)

Elettivo
<p>Interventi pianificabili, che non devono essere eseguiti in urgenza</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventi elettivi, inseriti il giorno precedente nel programma operatorio del giorno seguente • Interventi elettivi annunciati in seguito
Urgenza non vitale 6-24h (intervento urgente differibile)
Urgenza non vitale che necessita una presa a carico nelle 24h
Urgenza non vitale 1-6h (intervento urgente)
<p>Urgenza non vitale, che necessita una presa a carico nelle 6 ore seguenti.</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanguinamenti senza sintomi di shock • Infezioni/inflammazioni senza sintomi di shock <ul style="list-style-type: none"> ○ Perforazione/deiscenza addominale ○ Appendicite, colecistite, diverticolite, empiema, ascesso tubo-vaginale, ecc. • Ileo • Processi espansivi intracranici necessitanti una decompressione urgente ma non immediata • Ischemia d'organo <ul style="list-style-type: none"> ○ Occlusione vascolare subacuta/parziale, infarto senza possibilità di rivascolarizzazione, ernia incarcerata nell'adulto, ecc. • Fratture con presa a carico chirurgica <ul style="list-style-type: none"> ○ Fratture aperte, lussazioni articolari ○ Fratture periferiche (caviglia, radio ecc) che richiedono una presa a carico chirurgica rapida ○ Frattura del collo del femore con chirurgia conservativa della testa femorale, fratture in prossimità dell'articolazione dell'anca • Analgesia regionale in ostetricia (APD, CSE, Anestesia spinal per parto spontaneo in sala parto) • Taglio cesareo (CS) grado 3, se <6h (= CS non pianificata senza fretta; in caso di arresto di nascita di solito <2h)
Urgenza vitale < 1h (intervento immediato necessario)
<p>Urgenza vitale richiedente una presa a carico immediata</p> <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli interventi in sala di rianimazione, ogni rianimazione cardiopolmonare <ul style="list-style-type: none"> ○ Tutti i traumi (penetranti e non penetranti), ogni stato di shock • Emorragie importanti con sintomi di shock • Infezioni/inflammazioni (sepsi) con sintomi di shock <ul style="list-style-type: none"> ○ Sepsi addominale su perforazione/deiscenza, gangrena di Fournier, ecc. • Processi espansivi intracranici necessitanti una decompressione immediata • Ischemia d'organo critica necessitante un trattamento immediato <ul style="list-style-type: none"> ○ Occlusione vascolare acuta/completa, infarto con possibilità di rivascolarizzazione, sindrome di compartimento, ernia incarcerata del poppante, torsione testicolare, ecc. • Lesioni articolari aperte, lesioni estese alle estremità • Ustioni estese • Ritenzione urinaria nel bambino • Taglio cesareo (CS) grado 1 (=emergenza, flash, emergenza CS: immediatamente) e grado 2 (=penetrazione CS: <1h)



Informazioni supplementari a proposito di A-QUA

Sito web SGAR/SSAR: <http://www.sgar-ssar.ch/>, Rubrica „Qualitätsmanagement, A-QUA“

Sito web ProtecData AG: Programm A-QUA: <https://www.healthbase.ch/>, Rubrica A-QUA

Variazioni nella V1.1 di gennaio 2020

Le fasi del taglio cesareo (CS), gradi 1-3 aggiunti agli esempi.

Analgesia regionale in ostetricia (APD, CSE, Anestesia spinal per parto spontaneo in sala parto) aggiunto come esempio di " Urgenza non vitale 1-6h (intervento urgente)"

Versioni precedenti (History)

Version 1.0, Febbraio 2017