



Urgenza dell'intervento, definizione ed esempi (Var. 20202)

Elettivo
<ul style="list-style-type: none">• Interventi pianificabili, che non devono essere eseguiti in urgenza <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Interventi elettivi, inseriti il giorno precedente nel programma operatorio del giorno seguente• Interventi elettivi annunciati in seguito
Urgenza non vitale 6-24h (intervento urgente differibile)
<ul style="list-style-type: none">• Urgenza non vitale che necessita una presa a carico nelle 24h
Urgenza non vitale 1-6h (intervento urgente)
<ul style="list-style-type: none">• Urgenza non vitale, che necessita una presa a carico nelle 6 ore seguenti. <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sanguinamenti senza sintomi di shock• Infezioni/infi ammazioni senza sintomi di shock<ul style="list-style-type: none">○ Perforazione/deiscenza addominale○ Appendicite, colecistite, diverticolite, empiema, ascesso tubo-vaginale, ecc.• Ileo• Processi espansivi intracranici necessitanti una decompressione urgente ma non immediata• Ischemia d'organo<ul style="list-style-type: none">○ Occlusione vascolare subacuta/parziale, infarto senza possibilità di rivascolarizzazione, ernia incarcerata nell'adulto, ecc.• Fratture con presa a carico chirurgica<ul style="list-style-type: none">○ Fratture aperte, lussazioni articolari○ Fratture periferiche (caviglia, radio ecc) che richiedono una presa a carico chirurgica rapida○ Frattura del collo del femore con chirurgia conservativa della testa femorale, fratture in prossimità dell'articolazione dell'anca
Urgenza vitale < 1h (intervento immediato necessario)
<ul style="list-style-type: none">• Urgenza vitale richiedente una presa a carico immediata <p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tutti gli interventi in sala di rianimazione, ogni rianimazione cardiopolmonare<ul style="list-style-type: none">○ Tutti i traumi (penetranti e non penetranti), ogni stato di shock• Emorragie importanti con sintomi di shock• Infezioni/infi ammazioni (sepsi) con sintomi di shock<ul style="list-style-type: none">○ Sepsi addominale su perforazione/deiscenza, gangrena di Fournier, ecc.• Processi espansivi intracranici necessitanti una decompressione immediata• Ischemia d'organo critica necessitante un trattamento immediato<ul style="list-style-type: none">○ Occlusione vascolare acuta/completa, infarto con possibilità di rivascolarizzazione, sindrome di compartimento, ernia incarcerata del poppante, torsione testicolare, ecc.• Lesioni articolari aperte, lesioni estese alle estremità• Ustioni estese• Ritenzione urinaria nel bambino



Programma A-QUA_{CH} della SGAR/SSAR

Monitoraggio della qualità dell'anestesia in Svizzera

Informazioni supplementari a proposito di A-QUA

Sito web SGAR/SSAR: <http://www.sgar-ssar.ch/>, Rubrica „Qualitätsmanagement, A-QUA“

Sito web ProtecData AG: Programm A-QUA: <https://www.healthbase.ch/>, Rubrica A-QUA