



Programme A-QUA_{CH} de la SSAR

Monitoring de la qualité de l'anesthésie en Suisse

Berne/Winterthur, Février 2017

Urgence de l'intervention, définition et exemples (var. 20202)

Electif
<ul style="list-style-type: none"> • Interventions qui sont programmées et qui ne nécessitent pas une prise en charge immédiate <p>Exemples:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interventions électives, qui sont programmées la veille pour le lendemain • Interventions électives qui sont annoncées plus tard.
Urgence non vitale 6-24h (intervention urgente différée)
<ul style="list-style-type: none"> • Urgence non vitale qui nécessite une prise en charge dans les 24h
Urgence non vitale 1-6h (intervention urgente)
<ul style="list-style-type: none"> • Urgence non vitale, mais qui nécessite une prise en charge dans les 6h <p>Exemples:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hémorragies sans symptômes de choc • Infections / inflammations sans symptômes de choc <ul style="list-style-type: none"> ○ Perforation abdominale / lâchage ○ Appendicite, cholécystite, diverticulite, empyème, abcès tubovaginal etc. • Iléus • Processus intracérébral expansif qui nécessite une décompression urgente mais non immédiate. • Ischémie d'organes <ul style="list-style-type: none"> ○ Occlusion vasculaire subaiguë / partielle, infarctus sans possibilité de revascularisation, hernie incarcerated chez l'adulte, etc. • Fractures avec prise en charge chirurgicale <ul style="list-style-type: none"> ○ Fractures ouvertes, luxations d'articulations. ○ Fractures périphériques (fracture luxation de cheville, radius etc.) qui nécessitent une prise en charge chirurgicale rapide ○ Fracture du col du fémur avec chirurgie conservatrice de la tête fémorale ; fractures proches de l'articulation de la hanche.
Urgence vitale < 1h (intervention immédiate nécessaire)
<ul style="list-style-type: none"> • Urgence vitale qui nécessite une intervention immédiate <p>Exemples:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tous les déchocages et réanimations <ul style="list-style-type: none"> ○ Tous les traumatismes (perforant et non perforant) • Hémorragies sévères avec symptomatologie de choc • Infections sévères / inflammations (sepsis) avec symptomatologie de choc. <ul style="list-style-type: none"> ○ Sepsis abdominal sur perforation / lâchage, gangrène de Fournier etc. • Processus intracérébraux expansifs qui nécessitent une décompression immédiate • Ischémique critique d'organes qui nécessite une prise en charge immédiate <ul style="list-style-type: none"> ○ Occlusion vasculaire aiguë / complète, syndrome de compartiment, hernie incarcerated chez le nourrisson, torsion testiculaire etc. • Lésions à articulations ouvertes, lésions étendues des extrémités • Brûlures étendues • Rétention urinaire chez l'enfant.



Programme A-QUA_{CH} de la SSAR

Monitoring de la qualité de l'anesthésie en Suisse

Informations supplémentaires à propos d'A-QUA

Site web SGAR/SSAR : <http://www.sgar-ssar.ch/> , rubrique gestion de la qualité

Site web ProtecData SA, programme A-QUA : <https://www.healthbase.ch/> , rubrique A-QUA