

## Urgence de l'intervention, définition et exemples (var. 20202)

<b>Electif</b>
<p>Interventions qui seront programmées et qui ne nécessitent pas une prise en charge immédiate</p> <p><b>Exemples:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventions électives, qui sont programmées la veille pour le lendemain</li> <li>• Interventions électives qui sont annoncées plus tard.</li> </ul>
<b>Urgence non vitale 6-24h (intervention urgente différée)</b>
Urgence non vitale qui nécessite une prise en charge dans les 24h
<b>Urgence non vitale 1-6h (intervention urgente)</b>
<p>Urgence non vitale, mais qui nécessite une prise en charge dans les 6h</p> <p><b>Exemples:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hémorragies sans symptômes de choc</li> <li>• Infections / inflammations sans symptômes de choc             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Perforation abdominale / lâchage</li> <li>○ Appendicite, cholécystite, diverticulite, empyème, abcès tubovaginal etc.</li> </ul> </li> <li>• Iléus</li> <li>• Processus intracérébral expansif qui nécessite une décompression urgente mais non immédiate.</li> <li>• Ischémie d'organes             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Occlusion vasculaire subaiguë / partielle, infarctus sans possibilité de revascularisation, hernie incarcerated chez l'adulte, etc.</li> </ul> </li> <li>• Fractures avec prise en charge chirurgicale             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fractures ouvertes, luxations d'articulations.</li> <li>○ Fractures périphériques (fracture luxation de cheville, radius etc.) qui nécessite une prise en charge chirurgicale rapide</li> <li>○ Fracture du col du fémur avec chirurgie conservatrice de la tête fémorale; fractures proches de l'articulation de la hanche.</li> </ul> </li> <li>• Analgésie locorégionale obstétricale (Péri, CSE, rachi en salle d'acc pour accouchement par voie basse)</li> <li>• La césarienne (CS) degré 3, si &lt;6h (= CS non programmé, sans hâte; en l'absence de progression du travail &lt;2h)</li> </ul>
<b>Urgence vitale &lt; 1h (intervention immédiate nécessaire)</b>
<p>Urgence vitale qui nécessite une intervention immédiate</p> <p><b>Exemples:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les déchocages et réanimations             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tous les traumatismes (perforant et non perforant)</li> </ul> </li> <li>• Hémorragies sévères avec symptomatologie de choc</li> <li>• Infections sévères / inflammations (sepsis) avec symptomatologie de choc.             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sepsis abdominal sur perforation / lâchage, gangrène de Fournier etc.</li> </ul> </li> <li>• Processus intracérébraux expansifs qui nécessitent une décompression immédiate</li> <li>• Ischémique critique d'organes qui nécessite une prise en charge immédiate             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Occlusion vasculaire aiguë / complète, syndrome de compartiment, hernie incarcerated chez le nourrisson, torsion testiculaire etc.</li> </ul> </li> <li>• Lésions à articulations ouvertes, lésions étendues des extrémités</li> <li>• Brûlures étendues</li> <li>• Rétention urinaire chez l'enfant.</li> <li>• La césarienne (CS) degré 1 (=très urgente CS: aussi rapide que possible) et degré 2 (=urgente CS: &lt;1h)</li> </ul>



## Informations supplémentaires à propos d'A-QUA

Site web SGAR/SSAR: <http://www.sgar-ssar.ch/>, rubrique gestion de la qualité

Site web ProtecData SA, programme A-QUA: <https://www.healthbase.ch/>, rubrique A-QUA

## Évolution de la V1.1 de janvier 2020

Ajout l'analgésie locorégionale obstétricale (Péri, CSE, rachi en salle d'acc pour accouchement par voie basse) comme exemple pour "Urgence non vitale 1-6h (intervention urgente)"

Les degrés 1-3 d'urgence de la césarienne (CS) ont été ajoutés aux exemples.

## Versions précédentes (History)

Version 1.0, Février 2017