

## ANÄSTHESIELEISTUNGEN BEI AUGENEINGRIFFEN IN TARMED

Ärztliche Leistung	Verrechnung in TARMED
<p>Topische Tropfanästhesie Auge (Lokalanästhesie) durch Operateur, Hilfsperson, Anästhesiearzt oder – pflegfachperson und keine Leistung des Anästhesiearztes während Eingriff</p>	<p>Operateur: Lokalanästhesie aus Kap 00 resp 08 Anästhesist: Keine Verrechnung</p>
<p>Topische Tropfanästhesie Auge (Lokalanästhesie) durch Operateur, Hilfsperson, Anästhesiearzt oder – pflegfachperson und <b>Monitored Anesthesia Care</b> (mit oder ohne Analgosedation) während Eingriff.</p> <p>Der Anästhesiearzt ist verantwortlich und präsent. Seine Leistung ist auf medizinischen Dokumenten (Anästhesieprotokoll, Verordnungen) eindeutig ersichtlich.</p>	<p>Anästhesist <b>MAC</b> für die operative Position Kap 28</p> <p>Die Tropfanästhesie kann, auch wenn durch Anästhesisten durchgeführt, <u>nicht</u> separat verrechnet werden.</p> <p>Die Tropfanästhesie, auch wenn durch Anästhesisten durchgeführt, <u>berechtigt nicht</u> zur Verrechnung nach RK</p>
<p>Topische Tropfanästhesie Auge (Lokalanästhesie) durch Operateur, Hilfsperson, Anästhesiearzt oder – pflegfachperson und <b>Allgemeinanästhesie</b> während Eingriff.</p> <p>Der Anästhesiearzt ist verantwortlich und präsent. Seine Leistung ist auf medizinischen Dokumenten (Anästhesieprotokoll, Verordnungen) eindeutig ersichtlich.</p>	<p>Anästhesist <b>Risikoklasse</b> für die operative Position Kap 28</p>
<p>Retro- / Peribulbärblock (Regionalanästhesie) durch Operateur und <b>MAC</b> für die Blockade und anschliessend während Eingriff.</p> <p>Der Anästhesiearzt ist verantwortlich und präsent. Seine Leistung ist auf medizinischen Dokumenten (Anästhesieprotokoll, Verordnungen) eindeutig ersichtlich.</p>	<p>Operateur: Retro- / Peribulbärblock Kap 08</p> <p>Anästhesist: <b>MAC</b> für operative Position Kap 28</p>
<p>Retro- / Peribulbärblock (Regionalanästhesie) durch Operateur und <b>kurze Allgemeinanästhesie*</b> für die Blockade und anschliessend <b>MAC</b> während Eingriff.</p> <p>*tiefe Analgosedation mit Massnahmen zur Sicherung einer suffizienten (Be)Atmung = Allgemeinanästhesie</p> <p>Die tiefe Analgosedation, die anschliessende MAC und der Anästhesist sind auf medizinischen Dokumenten (Anästhesieprotokoll, Verordnungen) eindeutig ersichtlich.</p>	<p>Anästhesist <b>Risikoklasse</b> für operative Position Kap 28</p>
<p><b>Retro- / Peribulbärblock</b> (Regionalanästhesie) durch den Anästhesiearzt und <b>MAC</b> während Eingriff.</p> <p>Die Regionalanästhesie, die anschliessende MAC und der Anästhesist sind auf medizinischen Dokumenten (Anästhesieprotokoll, Verordnungen) eindeutig ersichtlich.</p>	<p>Anästhesist <b>Risikoklasse</b> für operative Position Kap 28</p>